PROTOCOLLO PAZIENTI ALLERGICI IN ELEZIONE RISONANZA MAGNETICA

- nel caso di pazienti con anamnesi positiva per **reazione avversa a mezzo di contrasto noto**, utilizzare una molecola differente seppur della medesima classe, tenendo conto dei pattern di cross-reattività tra mezzo di contrasto ;

Nel caso di pazienti con anamnesi positiva per **reazione avversa grave a mezzo di contrasto non noto** su consiglio della SIAAIC, utilizzare uno schema di premedicazione per via orale con

- **DELTACORTENE** cp 25 mg
  N° 2 cp 13h prima dell'esame
  N° 2 cp 7 ore prima dell'esame
  N° 2 cp 1 ora prima dell'esame + 1 cp cetirizina **ZIRTEC 10 mg** (antiistaminico)
  oppure
- **METILPREDNISOLONE** 40 mg im o ev
- N° 1 f 13h prima dell'esame
- N° 1 f 7 ore prima del'esame
- N° 1 f 1 ora prima del'esame + **Im Trimeton** fiale 10 mg
-

- nel caso di pazienti con orticaria in atto o asma bronchiale sintomatico, se possibile, rimandare l'esame fino alla stabilizzazione del quadro clinico; in alternativa, si può prendere in considerazione lo schema di premedicazione consigliato per gli esami in urgenza;

In caso di pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica, effettuare una premedicazione, su consiglia della SIAAIC, usando questo schema:

- **DELTACORTENE** (prednisone) cp 25 mg oppure
  N° 2 cp 12h prima dell'esame
  N° 2 cp 2 ore prima dell'esame
  N° 1 cp cetirizina **ZIRTEC 10 mg** (antiistaminico) 1 ora prima dell'esame
  oppure
- **MEDROL** (metilprednisolone) 40 mg im o ev
- N° 1 f 12 h prima dell'esame
- N° 1 f 2 ore prima del'esame +
- N° 1 f **Im Trimeton** 10 mg + montelukast **SINGULAIR** (antiist -antiasma) 10 mg cp