QUESTIONARIO MDC A BASE DI GADOLINIO
VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHIO NEFROTOSSICO
VALUTAZINE PRELIMINARE NIBROSI NEFROGENICA

PAZIENTE Cognome……..Nome……..
Data di nascita…….N° telefonico……..
Peso Kg……Creatinina……data esame…….

I fattori di rischio per la fibrosi nefrogenica sono:
funzionalità renale ridotta, soprattutto se eGFR <15 ml/min/1.73m2
pazienti dializzati.
Il rischio aumenta con dosi maggiori di mezzo di contrasto, ma può insorgere anche dopo una singola dose
Raccomandazioni: Corretta indicazione clinica; usare la minor dose possibile di mezzo di contrasto; segnalare nel referto il nome e la dose del mezzo di contrasto.
In elezione considerare tecniche alternative.

(Da compilare a cura del medico curante).

1) Storia clinica di razioni avverse moderate o severe a mdc a base di gadolinio SI NO
2) Storia di atopia che richiede un trattamento medico SI NO
3) Storia di asma bronchiale instabile SI NO
4) Il pz è affetto da insufficienza renale severa
eGFR <30ml/min/1.73m2

Oppure è in dialisi SI NO

5) Il paziente è affetto da insufficienza renale ridotta *
eGFR tra 30 e 60 ml/min/1.73 m2 SI NO

* Solo se si utilizzano mezzi di contrasto ad alto rischio

L'agenzia europea per il Farmaco (EMA) ha sospeso l'uso endovenoso di tutti i prodotti ad alto rischio (Omniscan®, Magnevist®) e l'Ente di Autorizzazione al Commercio ha tolto Optimark® dal mercato europeo.

- L'EMA ha stabilito che Magnevist® può essere usato per l'artrografia.

Il CMSC condivide queste raccomandazioni.

- L'EMA ha stabilito che i mezzi di contrasto a rischio intermedio (Multihance®, Primovist®) sono approvati solo per l'imaging epato-biliare.

Il CMSC condivide questa raccomandazione.

Compilato da_____ data _____

SC Radiologia ospedaliero-territoriale
Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei
via Dottor Giuseppe Pilia 1 - Piano terra
tel. 0782 490283