ASLOgliastra
Azienda socio-sanitaria locale

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
SC Radiologia ospedaliero-territoriale

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER MDC A BASE DI IODIO
VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHIO NEFROTOSSICO

Cognome…….**Nome**……

Data di nascita…….. Peso Kg……..

Ricoverato / Post-ricovero / esterno

Ospedale..... Reparto……..

Paziente collaborante: SI ☐ NO ☐ **CAMMINA** ☐ **SEDUTO** ☐ **BARELLATO** ☐

Si raccomanda di portare: esame della **CREATININA E DOCUMENTAZIONE SANITARIA PRECEDENTE**☐

Il pz ha già eseguito esame con mdc iodato?	**SI**	**NO**			
Storia clinica di reazioni avverse moderate o severe a mdc a base di iodio?	**SI**	**NO**	**Se SI seguire protocollo pz allergici allegato (in elezione o urgenza)**		
Storia di atopia che richiede un trattamento medico?	**SI**	**NO**	**Se SI seguire protocollo pz allergici allegato (in elezione o urgenza)**		
Storia di asma instabile?	**SI**	**NO**			
Ipertiroidismo?	**SI**	**NO**			
Scompenso cardiaco?	**SI**	**NO**			
Insufficienza epatica?	**SI**	**NO**			
Insufficienza renale?	**SI**	**NO**			
CREATININA (validità 30 giorni)					
ESAME ESGUITO IL					
eGFR					

Nb.: qualora sussista una o più delle condizioni suddette gli esami obbligatoriamente da eseguire sono:

GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA **Valutazione internistica**
GRAVE IN SUFFICIENZA CARDIACA **Valutazione cardiologica**

Il paziente è attualmente in trattamento con uno dei seguenti farmaci:

METFORMINA SI NO

Se il valore di GFR **è** tra 30 **e** 60 ml/min/1.73 m2, il paziente deve sospendere la **Metformina** 48 h prima dell'esecuzione dell'esame **Tc** con **mdc e** riprendere il farmaco dopo 48 h l'esecuzione dell'esame **Tac**.
Se il valore del GFR **è** meno di 30 ml/min/1.73 m2, l'esame **Tac** con **mezzo di contrasto** non deve essere eseguito.

INTERLEUCHINA 2.puo dare reazioni tardive avverse…… SI NO
FANS Non è consigliato sospendere..... SI NO
AMINOGLICOSIDI Non è consigliato sospendere ..... SI NO
BETA-BLOCCANTI .possono ridurre risposta all'adrenalina…… SI NO

METFORMINA IN EMERGENZA

Sospensione della metformina e monitoraggio post-procedurale dell'equilibrio acido base. L'assunzione della metformina dovrebbe essere ripresa 48 ore dopo la procedura se la creatinina e filtrato glomerulare sono invariati rispetto ai valori pre-procedurali.

IL CONSENSO E' AVVENUTO CON L'INTERVENTO DI UN MEDIATORE/INTERPRETE DI LINGUA……..

DATA , TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE **FIRMA PAZIENTE**

…… ……

SC Radiologia ospedaliero-territoriale
Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei
via Dottor Giuseppe Pilia 1 - Piano terra
tel. 0782 490283